

Buddleia

(Buddleja Davidii)



Fleurs regroupées sous la forme de cônes violets

Tige souple

Feuilles en forme de lance : côté vert denté et côté blanc doux



Floraison : J F M A M J J A S O N D



On la trouve proche des bords des voies de chemin de fer, des cours d'eau et des friches



DANGER

Empêche le développement d'autres espèces, peut empêcher la reproduction des papillons

Comment lutter ?

- **Arrachage au printemps** avant la production de graines, **attention à ne pas laisser de fragments de racines**
- **Coupe à la souche** avec débroussailleuse ou tronçonneuse de juillet à octobre + dessouchage
- **Coupe des fleurs à la fin de la floraison (septembre)**

| Gestion des déchets | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Laisser sur place | Compostage |
| Partie extérieure | Graines non mures | ✓* | ✓ |
| | Graines mures | ✓* | ✗ |
| Partie souterraine | | ✓* | ✗ |

*Si pas de risque de dissémination vers d'autres sites

| | Jun | Juliet | Août | Septembre | Octobre |
|--------------------------|-----|--------|------|-----------|---------|
| Arrachage | | | | | |
| Coupe à la souche | | | | | |
| Coupe des fleurs | | | | | |

